



Día mundial de Prevención del cáncer de cuello uterino

26 de marzo

¿Qué es el cáncer de cuello uterino?

- Es una alteración celular que se origina en el epitelio del cérvix.
- Se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución.
- Estas lesiones progresan a cáncer in situ (confinado a la superficie epitelial) o un cáncer invasor en donde las células con transformación maligna traspasan la membrana basal.




¿Cuáles son las cifras de este cáncer en el Perú?

- En el Perú, cada 5 horas muere una mujer por cáncer cervical.
- El cáncer de cuello uterino es el cáncer más notificado en las mujeres (24.1% de los cánceres en las mujeres).
- En la población general representa el 14.9% de todos los cánceres.
- Es la tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres.

¿Cuáles son los síntomas de alerta?

Este tipo de cáncer no produce signos ni síntomas en su fase inicial, sino cuando la enfermedad ya está presente. Estos síntomas pueden ser:


- Sangrado irregular o leve entre periodos menstruales en mujeres en edad reproductiva
- Sangrado menstrual más prolongado y abundante que lo habitual
- Sangrado posmenopáusico
- Sangrado después de mantener relaciones sexuales
- Aumento del flujo vaginal, en ocasiones con mal olor
- Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.




¿Cuáles son los factores de riesgo para este cáncer?

- Edad temprana en el inicio de las relaciones sexuales
- Multiparidad
- Tabaquismo
- Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)
- Uso excesivo y alargado en el tiempo de fármacos anticonceptivos hormonales
- Factores inmunosupresores.

¿Existe relación entre cáncer de cuello uterino y el Virus del Papiloma Humano (VPH)?



El VPH es una infección de transmisión sexual que se aloja en el aparato reproductor.



En muchas ocasiones el organismo puede contrarrestar este virus.



Pero, en otras, existe el riesgo de producir lesiones precancerosas en cuello uterino.

¿Cómo prevenimos este cáncer?

Prueba molecular de VPH:

- Es un método de detección accesible y gratuito que detecta la presencia de los VPH de alto riesgo en el cuello uterino, que, si no se tratan, con el tiempo pueden desarrollar un cáncer.
- Se realiza a las mujeres entre los 30 y los 49 años en conjunto con la toma del PAP y en caso de resultar negativo se repite cada 5 años.

Prueba contra el VPH:

- Previene la infección de los VPH que causan aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de cuello de útero.
- La vacuna está dentro del Calendario Nacional de Vacunación, está autorizada para niñas y adolescentes de 9 a 13 años.
- Las vacunas no tienen efecto terapéutico. El momento ideal para vacunarse es antes de haber comenzado las relaciones sexuales.

Test de Papanicolaou (PAP):

- Es un estudio sencillo cada 3 años, que detecta lesiones en el cuello del útero, en mujeres de 50 a 64 años.
- Es indoloro. Si se obtienen dos PAP negativos consecutivos ya no se recomienda seguir haciendo tamizaje.

¿Cómo se tratan las lesiones premalignas que se encuentren?

- Retirar la lesión a través de crioterapia, que elimina las áreas precancerosas del cuello uterino mediante congelación.
- O a través de la termocoagulación, la cual utiliza electricidad generando temperaturas suficientes para la ablación de las lesiones cervicales.
- Otra opción es retirar las áreas anormales del cuello uterino utilizando un asa hecha de un alambre delgado que corta y coagula al mismo tiempo, coagulando la zona con un electrodo.



MAPFRE © 2026
Av. Armendáriz 345
Miraflores
Lima - Perú



prevencion.mapfre.com.pe